


## Kunningarlepi:



## Carnitin 333 mg tablettir og Carnitin 100 mg/ml miksturur

Les kunningarlepan væl, áðrenn tú byrjar at taka Carnitin tilbúningarnar.

### 1. *Hvat er Carnitin og hvat er tað gott fyri ?*

Kemiskt er Carnitin eitt kvaterner ammoniumbinding, biosyntetiserað út frá aminosýrunum Lysine og Methionin. Carnitin finst í næstan øllum kyknum í kroppinum. Carnitin finst sum D- og L-carnitin. Tað er bara L-carnitin formurin, ið er aktivur. Carnitin hevur ein avgerandi leiklut í framleiðslu av orku í kroppinum. Carnitin flytir langketu-feittsýrur (við meiri enn 12 C-atomum) inn í mitochondriini, har tær verða brúktar til at framleiða orku. Carnitin flytir eisini eitrandi evni út úr kyknum. Í vøddum við beinagrindina og hjartanum eru ketonir, ið hava sín uppruna frá feittsýrum, høvudsbrennievni. Tí er tað serliga umráðandi at hesar kyknur hava nóg mikið av carnitin.

Kroppurin framleiðir vanligu nóg mikið av carnitin. Ein frískur persónur framleiðir vanligu umleið 0,16 -0,48 mg/kg kropsvekt/samdøgur. Carnitin finst eisini í lutfalsliga stórum nøgdum í mati, og tá serliga í reyðum kjøti. Fólk við genetiskum ella medisinskum breki kunnu koma at mangla carnitin. Tá er tað av alstórum týdningi, at fáa carnitin ískoyti.

### 2. *Tilbúningar:*

- a. **Carnitin 333 mg tablettir** (hvítar, avlangar við kervi):  
1 tablett inniheldur L-carnitin-L-tartrat, ið svarar til 333 mg av L-carnitin.  
Hjálpnevni: Microcrystalinska cellulosu, silica colloidal anhydrous, magnesiumstearat og natriumcroscarmellosu.

- b. **Carnitin 100 mg/ml miksturur:** 1 ml inniheldur 100 mg av L-carnitin.  
Hjálpievní: Sorbitol, Glyserol, hindberja aroma og reinsað vatn.  
Haldevni: Paraoxybenzoat.

3. **Indikati3n:** Primer og sekunder carnitinmangul. Pers3nar, i3 hava fingi3 sta3fest CTD (Carnitin Transporter Deficiency) og pers3nar, i3 hava fingi3 sta3fest l3gt carnitin innihald í bl33inum vegna status sum berarar ella anna3 3lag.

4. **Skamtur:** Ver3ur 3settur av l3kna 3t fr3 3rsliti av carnitinkonsentrati3nini í bl33roynd. Dagligi skamturinn skal helst b3tast í 3 - 4 fyri at f3a eina so javna konsentrati3n sum m3guligt. Ta3 er ymiskur skamtur til pers3nar, i3 ikki hava CTD og til teir, i3 hava fingi3 sta3fest CTD.

Vanliga er byrjunarskamturinn til pers3nar uttan CTD: 20-25 mg/kg/samd3gur og til teir, i3 hava fingi3 sta3fest CTD er byrjunarskamturinn til b3rn: 100 – 200 mg/kg /samd3gur til b3rn og til vaksin 1 gramm 3 fer3ir um dagin . Skamturinn ver3ur regula3ur 3t fr3 m3tingum av carnitininnihaldinum í bl33inum.

T3 carnitindepotini eru fylt, er langt3arskamturinn hesin fyri ein mi3al pers3n (70 kg):

**Berarar:** ½ Carnitin 333 mg tablett 3 fer3ir um dagin ella  
1,5 ml Carnitin mikstur 100 mg/ml 3 fer3ir um dagin.

**CTD-sj3k:** 3 Carnitin 333 mg tablettir 3 fer3ir um dagin ella  
10 ml Carnitin Mikstur 100 mg/ml 3 fer3ir um dagin.

Ni3anfyri er ein talva vi3 lei3beinandi byrjunarskamtum:

**Byrjunarskamtir til pers3nar vi3 l3gum carnitin, men i3 ikki hava CTD :  
(20-25 mg/kg kropsvekt/samd3gur)**


	<b>Kropsvekt</b>	<b>Mongd um samd3gri3</b>	<b>Mongd per m3na3</b>
Carnitin Mikstur 100 mg/ml	10 kg	1 ml x 2	60 ml
Carnitin Mikstur 100 mg/ml	20 kg	2 ml x 2	120 ml
Carnitin Mikstur 100 mg/ml	30 kg	3 ml x 2	180 ml
Tablettir 333 mg	15 kg	½ tabl. x 2	30 tabl.
Tablettir 333 mg	25 kg	1 tabl. x 2	60 tabl.
Tablettir 333 mg	40 kg	1 tabl. x 3	90 tabl.
Tablettir 333 mg	60 kg	2 tabl. x 2	120 tabl.
Tablettir 333 mg	75 kg	2 morgni 1 middegi 2 kv3l3di	150 tabl.
Tablettir 333 mg	90 kg	2 tabl. x 3	180 tabl.

**Byrjunarskamtir til CTD-sj3klingar:  
(100-200 mg/kg kropsvekt/samd3gur)**

	<b>Kropsvekt</b>	<b>Mongd um samd3gri3</b>	<b>Mongd um m3na3in</b>
Carnitin Mikstur 100 mg/ml	10 kg	5 ml x 2 (ella: 2,5 ml x 4)	300 ml
Carnitin Mikstur 100 mg/ml	20 kg	10 ml x 2 (ella 7 ml x 3)	600 ml
Carnitin Mikstur 100 mg/ml	30 kg	15 ml x 2 (ella 10 ml x 3)	900 ml
Carnitin tablettir 333 mg	upp til 25 kg	1 tabl. x 3	90 tabl.
Carnitin tablettir 333 mg	> 25 kg	3 tabl. x 3	300 tabl.

5. **Graviditetur:** Tá kvinna gerst við barn, lækkar carnitininnihaldi vanliga, og tað skal havast í huga, um kvinnan undan graviditetinum er í viðgerð. Tað ber væl til at taka carnitin, sjálvst um kvinna er við barn. Carnitin er eitt evni, ið kroppurin sjálvur framleiðir. Tí er ikki sannlíkt, at vandi stendst av at taka carnitin.
6. **Barna- og bróstakonur:** Bróstakonur kunnu væl geva bróst, sjálvst um tær eru í carnitinviðgerð.
7. **Interaktiónir:** Pivalinsýra lækkar carnitin í kroppinum munandi – heilt niður í 50 %. Pivalinsýra er í hesum heilivági: Pondocillin® (pivampicillin) og Selexid® (pivmecillam). Tí er ikki ráðiligt at taka hendan heilivágin saman við carnitin.  
Valproatsýra (antiepileptika) og hesi evni móti HIV infektiónum: zidovudine (AZT), didanosine (ddl), zalcitabine (ddC) og stavudine (d4T), kunnu elva til sekundert L- carnitin trot.  
Ifosfamid og cisplatin (cytostatika) kunnu økja um vandan fyri sekunderum L-carnitin troti.  
Tað er eisini eitt rímligt sannlíkindi fyri, at L-carnitin ískoyti kann fyrbyggja cardiomyopati (= sjúka uttan orsök í hjartavøddunum) elvt av doxorubicin (Adriamycin®) viðgerð. Kelda: <http://pi.oregonstate.edu/infocenter/othernuts/carnitine/> (accessed 11.6.2009)
8. **Eitran:** Tað fyriliggur einki um eitran av carnitin. Stórir skamtir av carnitin kunnu geva diarré.
9. **Hjáárin:** Sodningarleiðin kann ávirkast, um tú tekur stórar nøgdir av carnitin í longri tíð. Talan er um t.d. kvalma, spýggja, magakrampar og leyst lív (diarré). Eisini kann kroppurin fáa ein fiskakendan lukt.

Hesin kunningarlepi er dagfördur 05-02-2010



Tjaldurs Apotek